Alto a la Tuberculosis



La tuberculosis se propaga cuando una persona enferma tose, canta o habla y usted respira el aire contaminado con los microbios de la tuberculosis.



Los microbios entran en sus pulmones. De allí, pueden irse a otras partes de su cuerpo.



Su organismo lucha contra los microbios de la tuberculosis.



Si su cuerpo logra controlar los microbios, usted tendrá la INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE. Cuando esto ocurre:

- Tiene resultados positivos a la prueba cutánea de la tuberculina o al examen de sangre para detectar la tuberculosis.
- No se siente enfermo.
- No tiene síntomas de tuberculosis.
- No puede pasarles los microbios de tuberculosis a otras personas.
- Tiene radiografía de tórax normal.



Puede tomar medicinas para el tratamiento de la INFECCIÓN DE TUBERCULOSIS LATENTE y evitar llegar a tener la ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS.



Tomar su medicina para la tuberculosis es muy importante. Necesita tomar la medicina para mejorarse y evitar contagiar a otras personas con los microbios de la tuberculosis.



Esta enfermedad se contrae cuando los microbios de la tuberculosis se multiplican, y atacan los pulmones y otras partes del cuerpo. Cuando esto ocurre:

- Usted tiene resultados positivos a la prueba cutánea de la tuberculina o al examen de sangre para detectar la tuberculosis.
- Se siente enfermo con tos, tiene fiebre, pérdida de peso, dolor en el pecho o sudores nocturnos.
- Tiene microbios de la enfermedad de tuberculosis en su cuerpo.
- Puede pasarles los microbios de tuberculosis a otras personas.
- Puede tener una radiografía de tórax anormal.

CS230017